



CONSULTÓRIO CM

MEDICINA DENTÁRIA

Os dentes que estão a mais podem prejudicar os dentes definitivos

POR DRA. RITA RAMOS / MALO CLINIC



OS DENTES QUE ESTÃO A MAIS DEVEM SER EXTRAÍDOS? HÁ RISCOS?

Devem e não há riscos. São dentes que não têm função, estão lá a mais, e que normalmente são mais pequenos e estão menos ancorados ao osso. Na dentição definitiva, o normal é termos 32 dentes e na de leite são 20 dentes. Muitas vezes, há o perigo de prejudicarem um dente definitivo que queira erupcionar, no caso de ser uma dentição de leite. Esse dente definitivo não o consegue fazer porque tem ali um entrave. É uma simples extração se for detetado precocemente, quanto mais tempo permanecem na boca, mais difícil é esse procedimento.

QUAL É O LOCAL DA BOCA ONDE SURTEM MAIS?

O mais frequente é surgirem na arcada superior, à frente, mas não é o único local. Além

do dente do siso, por exemplo, as pessoas podem ter um quarto molar atrás. Um dente a mais pode causar enxaquecas, o que é frequente.

E A IDADE MAIS FREQUENTE?

É mais frequente surgir na dentição definitiva, mas acontece também na de leite. Os primeiros dentes definitivos nascem por volta dos seis anos e poderá acabar por surgir por volta dessa idade.

UM DENTE NO CÉU DA BOCA DE UM BEBÉ É UM DENTE A MAIS?

Este cenário pode estar relacionado com a má posição dentária e não ser um dente a mais. Pode ocorrer devido ao dente de leite não ter caído quando devia, porque o definitivo não nasceu onde devia para criar a mobilidade no dente de leite.

AMANHÃ: OTORRINOLARINGOLOGIA

ENVIE AS SUAS PERGUNTAS PARA O EMAIL SOCIEDADE@CMJORNAL.PT